

Dicloprin® Gel

Inserto



Dicloprin® Gel

diclofenaco dietilamina - arnica - phytoplenolin

I



FÓRMULA: Cada gramo contiene:

Diclofenaco Dietilamina equivalente a Diclofenaco sódico	10.0mg
Extracto glicólico de Arnica	5.0mg
Extracto de Phytoplenolin (<i>Centipeda cunninghami</i>).....	5.0mg
Excipientes	c.s.

PROPIEDADES: DICLOPRIN® disminuye localmente los signos y síntomas de la inflamación, como son el dolor, el calor, la coloración y el edema provocado por traumas de diferentes formas como suceden en el deporte y en otras actividades diarias. Alivia también los signos y síntomas inflamatorios locales de las enfermedades degenerativas reumáticas en sus estadios agudos y crónicos. Estimula la circulación sanguínea local reduciendo el tiempo de permanencia de los hematomas y la acumulación de líquidos propios de los procesos inflamatorios.

INDICACIONES: DICLOPRIN® está indicado en problemas inflamatorios localizados de origen traumático y reumático: Bursitis, tendinitis, contusiones, artrosis, espalda baja dolorosa, dolores musculares y articulares localizados.

PRECAUCIONES: DICLOPRIN® debe aplicarse en la piel del área cuando no tenga ninguna herida; tampoco debe cubrirse el sitio de aplicación ni exponerla a la luz solar. Evitar el contacto de este medicamento con los ojos y con los tejidos que recubren la boca, la nariz y la vagina. No se recomienda su uso en mujeres durante el embarazo ni la lactancia.

CONTRAINDICACIONES: No usar en pacientes con antecedentes de asma, rinitis alérgica y urticaria secundarias al uso de aspirina y por otros antiinflamatorios no esteroideos incluido el Diclofenaco.


EFFECTOS SECUNDARIOS: Dermatitis locales acompañadas de prurito, eritema, edema con vesículas, pápulas, ampollas o descamación. En ocasiones se presenta rash generalizado, asma, angioedema y reacciones de fotosensibilidad.

FORMA DE APLICACIÓN: DICLOPRIN® debe aplicarse uniformemente en el área enferma y hacer suave fricción sobre ella hasta que no quede ningún residuo, tres a cuatro veces al día.

PRESENTACIÓN: Tubo colapsible con 30g.

LABORATORIOS LAPRIN, S. A.
Guatemala, C. A.

Guía de troquel y medidas



INDICACIONES		FIRMAS	
<p>Inserto para Dicloprin Gel Medida: 140x95 mm Papel: Bond 60 gramos</p> <p>■ negro</p> <p>Observaciones: *DISEÑO PARA AJUSTAR A TROQUEL *Troquel indicado para efectos de referencia, en cuanto a distancias, tamaños de textos y elementos gráficos. *Medidas en milímetros *Textos aprobados por Ministerio de Salud de Guatemala. *Barra de Control: 50 mm de izquierda a derecha. Ubicada en el primer dobléz (justo a la mitad, es decir 2 mm hacia arriba y 2 mm hacia abajo), este primer dobléz está a 22 mm del borde superior *Última actualización del arte: 18 de junio de 2018</p>	ASUNTOS REGULATORIOS	Astrid Asencio	
	ASUNTOS REGULATORIOS	Ofyluz de García	