

# Floxaprin®

Inserto para comprimidos



## Floxaprin®

levofloxacin  
Antibacteriano  
Comprimidos recubiertos



### FÓRMULA:

#### Floxaprin® 500mg

Cada comprimido contiene:  
Levofloxacin Hemihidrato (512.47mg) equivalente a Levofloxacin ..... 500 mg  
Excipientes ..... c.s.

#### Floxaprin® 750mg

Cada comprimido contiene:  
Levofloxacin Hemihidrato (768.70mg) equivalente a Levofloxacin ..... 750 mg  
Excipientes ..... c.s.

**DESCRIPCIÓN:** Floxaprin®, es un antibacteriano activo contra gérmenes gram-positivo y gram-negativo.

**INDICACIONES:** Tratamiento de infecciones moderadas o severas del aparato respiratorio, urinario, piel y tejidos blandos causadas por bacterias sensibles a **Floxaprin®**: sinusitis aguda, exacerbación de bronquitis crónica, neumonía, abscesos, celulitis, forúnculos, impétigo, piodermitis e infección de heridas.

### DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

#### Adultos:

Indicación	Dosis cada 24 horas (mg)	Duración (días)
Exacerbación bacteriana de bronquitis	500	7
Neumonía adquirida en la comunidad	500 750	7 - 14 5
Neumonía nosocomial, infecciones complicadas de piel y tejidos blandos	750	7 - 14
Prostatitis bacteriana crónica	500	28
Pielonefritis, infecciones complicadas del tracto urinario	250	10
Sinusitis	500	10 - 14
Infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos	500	7 - 10
Infecciones no complicadas del tracto urinario	250	3

Se requiere ajuste de la dosis en pacientes con disfunción renal.

### CONTRAINDICACIONES:

**Floxaprin®** no debe usarse en pacientes con alergia a las quinolonas. El uso de Levofloxacin en niños, adolescentes, embarazo y lactancia, está contraindicado debido a que puede producir daño al cartilago en crecimiento.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En pacientes con epilepsia o con antecedentes de trastornos del SNC queda bajo supervisión del médico tratante por el riesgo de convulsiones. Se debe asegurar la correcta hidratación del paciente con objeto de prevenir la formación de cristales en la orina. Se recomienda que los pacientes eviten una excesiva exposición a la luz solar y si se produce fototoxicidad, el tratamiento debe ser interrumpido. En caso de aparición de rash cutáneo u otros signos de alergia, debe suspenderse su administración.

### INTERACCIONES

La absorción de Floxaprin® puede ser reducida de manera considerable si se administra concomitante con sucralfato, sales de calcio, hierro, zinc y antiácidos que contienen aluminio o magnesio. La administración conjunta con teofilina eleva los niveles plasmáticos de teofilina. La administración conjunta con drogas antiinflamatorias no esteroideas puede aumentar el riesgo de estimulación del SNC. Aumenta la acción de los hipoglucemiantes orales. Incrementa el riesgo de arritmias cardíacas en pacientes susceptibles. Evitar la administración conjunta con agentes antidiabéticos y warfarina.

### EFFECTOS SECUNDARIOS

Molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o dispepsia.

### PRESENTACIONES

**Floxaprin® 500mg** Caja X 7, 10 y 28 comprimidos.

**Floxaprin® 750mg** Caja X 5 comprimidos.

**LABORATORIOS LAPRIN, S. A.**  
Guatemala, C. A.