

MULTISINTOMAS

# Neumonil<sup>®</sup>

## Forte

**Para el tratamiento  
sintomático de la GRIPE**

- **Dolor de cabeza**
- **Fiebre**
- **Congestión nasal**
- **Tos**
- **Secreción nasal**
- **Dolor de cuerpo**
- **Estornudos**

Fórmula: Cada comprimido contiene:

Acetaminofén.....	500 mg
Clorfeniramina Maleato.....	2 mg
Dextrometorfano Bromhidrato.....	10 mg
Fenilefrina Clorhidrato.....	5 mg
Excipientes.....	c.s.

Indicaciones: NEUMONIL FORTE contiene Acetaminofén que alivia el dolor de cabeza, malestar general y baja la fiebre. Clorfeniramina que elimina el lagrimeo, la picazón y secreción nasal. Dextrometorfano que calma la tos. Fenilefrina que despeja la congestión nasal.

Dosis: Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar 1 ó 2 comprimidos cada 4-6 horas (sin exceder de 8 en 24 horas).

Precauciones y efectos secundarios: Si está bajo tratamiento médico consulte antes de tomar este medicamento y en los casos siguientes: Embarazo, lactancia, hipertensión, problemas cardíacos, tos persistente o crónica como ocurre con fumadores, asma y enfisema, o si la tos es acompañada por excesiva flema y en pacientes de edad avanzada.

- Evitar bebidas alcohólicas.

- Este producto puede causar somnolencia, si esto ocurre no conducir automóvil u operar maquinaria.

- Además puede causar nerviosismo, palpitaciones, insomnio y resequead en la boca. Normalmente estas reacciones desaparecen reduciendo la dosis; en caso de que persistieran descontinúe el tratamiento. A las dosis recomendadas generalmente, no se observan efectos secundarios indeseables.

- Utilice con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

- Si los síntomas persisten, se agravan o aparecen otros síntomas consulte a su médico.

- No exceda la dosis recomendada.

- Reacciones adversas frecuentes como: mareo, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, debilidad muscular, retención urinaria o dificultad al orinar, resequead en nariz y garganta, pérdida del apetito, dermatitis exfoliativa, aumento de la sudoración, visión borrosa, diplopía.

- Reacciones adversas raras como: Síndrome de Steven-Johnson, Necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantemática generalizada aguda. Por lo que se recomienda llevar una vigilancia estrecha a los pacientes que consuman este producto. Interacciones: Inhibidores de la Monoamino Oxidasa, otros depresores del Sistema Nervioso Central, alcohol, otros medicamentos que contengan Acetaminofén, Anticolinérgicos, Amiodarona, Fluoxetina o Quinidina, bloqueadores alfa y beta adrenérgicos, medicamentos oxitóxicos, agentes simpaticomiméticos.

Contraindicaciones: En pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, pacientes alcohólicos, pacientes con enfermedades graves; del hígado o hepatitis viral, insuficiencia renal severa, tiroides, diabetes mellitus, o hipertrofia prostática. Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa o galactosa no debe tomar este medicamento.

Advertencias: No administrar por más 10 días consecutivos en adultos y niños mayores de 12 años.

- Se han producido casos de hepatotoxicidad con dosis diarias inferiores a 4g.

- No se administre si nuevos síntomas aparecen.

- No administrar si hay enrojecimiento o hinchazón.

- Existe sensibilidad cruzada, pacientes que no toleran un antihistamínico, también pueden no tolerar otro antihistamínico.

- No tomar alcohol ni otros depresores del SNC.

VENTA LIBRE. Registros sanitarios: Guatemala PF-39483; El Salvador RG2031090108; Honduras RMH PF- 39483; Nicaragua RMN PF-39483; Panamá 74860. Producto Centroamericano hecho en Guatemala por Eurofarma Guatemala, S.A. Almacenar a temperatura ambiente (menor de 30°C). Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños. Servicio al cliente: (502) 6637-4569.