



# VADEMECUM 2025



# Clorexil®

## Clorhexidina

0.06%

0.03%



- Prevención y tratamiento de la gingivitis, ayuda a reducir la inflamación y enrojecimiento de las encías. Antiséptico antimicrobiano que previene la acumulación de la placa dental. Profilaxis o tratamiento de las infecciones bucofaríngeas, como la candidiasis oral. Posterior a cirugías periodontales, como antiséptico y desinfectante en la prevención de infecciones.
- **Dosis:** Enjuague durante un periodo de 30 a 60 segundos, dos o tres veces al día.



# Pronol®

## Naproxeno Sódico



- Tratamiento del dolor leve o moderado. Tratamiento sintomático de la artritis reumatoide, osteoartritis, episodios agudos de gota y espondilitis anquilosante. Alivio de la sintomatología en la dismenorrea primaria. Tratamiento sintomático de las crisis agudas de migraña.
- **Dosis:** Únicamente adultos 1 tableta recubierta (200 mg de naproxeno) cada 8-12 horas.



# Neumonil G®

## Benzocaina + Cloruro de Decualinio



- Alivia el dolor, ardor, resequedad e irritación de garganta, también es de utilidad en el alivio de molestias ocasionadas por tratamientos dentales.
- **Dosis:** Adultos y Niños mayores de 12 años: Una pastilla chupada lentamente cada 2 horas según las necesidades. No más de 8 pastillas en un período de 24 horas. Niños menores de 12 años: No se recomienda su uso. Ancianos: No hay necesidad de reducción de dosis para ancianos.



# Atenua®

## Dexketoprofeno Trometamol

25 mg

10  
Tabletas

100  
Tabletas

- En el alivio del dolor de intensidad variable de distinta etiología: dolor osteomuscular, dismenorrea, dolor de raíces dentarias, dolor post-operatorio, traumatismo, esguinces, etc.
- **Dosis:** 1 comprimido (25 mg de dexketoprofeno) cada 8 horas, sin sobrepasar los 3 comprimidos al día (75 mg).



# Etoricoxib®

## Etoricoxib




- Alivio sintomático de la artrosis, la artritis reumatoide (AR), la espondilitis anquilosante y el dolor y signos de inflamación asociados a la artritis gotosa aguda.
- **Dosis:** 120 mg una vez al día que sólo debe utilizarse durante el periodo de dolor agudo, limitada a un máximo de 8 días de tratamiento. La dosis recomendada es de 90 mg una vez al día, limitada a un máximo de 3 días de tratamiento.



# Laprimox CLAV®

## Amoxicilina + Ácido clavulanico



- Infecciones del tracto respiratorio superior (que incluyen oído, nariz y garganta): en particular sinusitis, otitis media, amigdalitis recurrente.
- **Dosis:** Un comprimido de amoxicilina + clavulanato de potasio de 875 mg + 125mg, dos veces al día.



**Hable con nosotros**



<https://callto.eurofarma.com.br:5001/callus>



[cliente.gt@eurofarma.com](mailto:cliente.gt@eurofarma.com)